

## NOTA

***BUTIA ERIOSPATHA* (DRUDE) BECC., PALMERA NATURALIZADA EN EL NORTE DE MISIONES (ARGENTINA)**ANTONIO KRAPOVICKAS<sup>1</sup> & MASSIMILIANO DEMATTEIS<sup>1</sup>

**Summary:** Krapovickas, A. & M. Dematteis. 2008. *Butia eriospatha* (Drude) Becc., palm naturalized in northern Misiones (Argentina). Bonplandia 17(1): 91-92. ISSN: 0524-0476.

*Butia eriospatha* (Drude) Becc. is cited for the first time for the flora of Argentina. This species can be distinguished from other species of the genus by its glaucous leaves and the densely tomentose spathe.

**Key words:** Palmeae, *Butia*, naturalized.

**Resumen:** Krapovickas, A. & M. Dematteis. 2008. *Butia eriospatha* (Drude) Becc., palmera naturalizada en el norte de Misiones (Argentina). Bonplandia 17(1): 91-92. ISSN: 0524-0476.

*Butia eriospatha* (Drude) Becc. es citada por primera vez para la flora de Argentina. Esta especie se diferencia de otras especies del género por las hojas glaucas y la espata densamente tomentosa.

**Palabras clave:** Palmeae, *Butia*, naturalizada.

*Butia eriospatha* (Drude) Becc. es una palmera característica y exclusiva de la «zona dos campos» del planalto meridional de Brasil, donde vive en Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Debido a su buen aspecto es frecuentemente cultivada en jardines y plazas de las principales ciudades del planalto de Santa Catarina (Reitz, 1974: 59).

Es una palmera de 3-4 m de altura fácilmente reconocible por sus hojas pinnadas, glaucas, pecíolos con espinas y por la espata de la inflorescencia con tomento castaño oscuro, denso y persistente (Fig. 1 B).

Según un poblador de Campina de América, procedente de Santa Catarina, cultivó esta palmera en su jardín y se multiplicó naturalmente en la zona. Tuvimos oportunidad de observar palmeras de distintas edades y for-

mando a veces pequeños grupos de 5 ó 6 individuos (Fig. 1 A).

Esta es la primera cita de *Butia eriospatha* para Argentina, pues no figura en la abundante bibliografía sobre palmeras. Tampoco es citada en el Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina, donde Xifreda y Sanso (1996) solamente mencionan *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* y *B. yatay* subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso.

Material estudiado: **ARGENTINA. Misiones:** Campina de América, 10 km E de Bernardo de Irigoyen, naturalizada, 10-III-2006, Krapovickas & Dematteis 47926 (CTES). **BRASIL. Santa Catarina:** 10 km E de Ponte Serrada, ca. 26°50'S 52°W, 17-II-1978, Krapovickas & Cristóbal 33704 (CTES, F, MBM).

<sup>1</sup> Instituto de Botánica del Nordeste, Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes, Argentina.

**Bibliografía**

REITZ, B. 1974. Palmeiras. Fl. Il. Catar. PALM: 1-189.

XIFREDA, C. C. & A. M. SANZO. 1996. Areaceae. In F. O. Zuloaga & O. Morrone (eds.). Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina, I: 104-106.



Fig. 1. *Butia eriospatha*. A: ejemplares adultos y B: espata.

Original recibido el 21 de marzo de 2008; aceptado el 22 de mayo de 2008.